

LA ANTIRRETROVIRALES INYECTABLES DE ACCIÓN PROLONGADA

¿CÓMO SE RECETAN LOS FÁRMACOS ANTIRRETROVIRALES INYECTABLES DE ACCIÓN PROLONGADA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH EN ADOLESCENTES Y ADULTOS?

La suspensión inyectable de liberación prolongada de cabotegravir (APRETUDE) se administra en forma de dos inyecciones iniciales (600 mg, 3 ml) con un mes de diferencia entre ellas y, cada dos meses en lo sucesivo. Se pueden administrar comprimidos orales de cabotegravir durante un mes antes del inicio de la primera inyección para evaluar la tolerabilidad al medicamento.

En diciembre de 2021, la FDA aprobó la suspensión inyectable de liberación prolongada de cabotegravir para la prevención del VIH para su uso en adultos y adolescentes¹.

Las personas deben tener un resultado negativo de una prueba de VIH-1 antes de iniciar el régimen de prevención inyectable con cabotegravir.

La eficacia de la suspensión inyectable de liberación prolongada de cabotegravir como PrEP se evaluó en dos estudios que realizó la Red de Ensayos Clínicos para la Prevención del VIH (HPTN). En el estudio HPTN 083 se enrolaron hombres cisgénero y mujeres transgénero que tienen sexo con hombres cisgénero, mientras que en el estudio HPTN 084 se enrolaron mujeres cisgénero. Se determinó que la suspensión inyectable de liberación prolongada de cabotegravir como PrEP es extremadamente eficaz para prevenir la adquisición del VIH.

¹ Que pese por lo menos 35 kg o 77 libras

Converse con su médico para saber si la suspensión inyectable de liberación prolongada de cabotegravir (APRETUDE) es el método de prevención del VIH adecuado para usted.